

# כיצד לעצור דימומים


MAGEN  
DAVID  
ADOM  
IN ISRAEL



שטף דם נגרם כאשר נוזל הדם יוצא מחוץ לכלי הדם (עורקים, ורידים).  
הטיפול בשטף דם פורץ יתבצע על ידי הפעלת לחץ חזק וישיר על מקור הדימום.

## כיצד נטפל בנפגע?

- 1 ראשית אם קיים ברשותנו, נשתמש בערכת עזרה ראשונה ובכפפות חד פעמיות
- 2 נפעיל לחץ חזק וישיר על מקור הדימום עם היד ולאחר מכן באמצעות תחבושת סטרילית
- 3 אם הדימום לא נעצר, נפעיל לחץ נוסף באמצעות משולש בד/ סדין/ מגבת
- 4 במקרה של קטיעה או אם הדימום אינו נשלט, נניח חסם עורקים מעל מקור הדימום
- 5 במקומות שלא ניתן להניח תחבושת או חסם עורקים, נפעיל לחץ ידני על העורק הקרוב ביותר
- 6 במקרים של ירידה במצב ההכרה של הנפגע ודימום שאינו נשלט, חייג מייד **101** והזעק צוות מד"א



הירשם  
עוד היום!

שתפו את המשפחה והחברים הקרובים לכם  
ובואו ללמוד כיצד לזהות ולטפל במגוון של מצבי חירום נפוצים במד"א

ללימוד נוסף ולמידע על קורסים ניתן לפנות למחלקת הדרכה:  
באתר הרשמי: [WWW.MDAIS.ORG](http://WWW.MDAIS.ORG) או בטלפון: 1-700-500-430

מצילים חיים גם בפייסבוק!